crea

Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria

Centro di ricerca
Viticoltura ed Enologia

Tecniche attuali e di prospettiva per il miglioramento genetico

Riccardo Velasco,
Direttore del CREA VE

Miglioramento genetico della vite al CREA VE

Progetto "GLERES": miglioramento genetico per le principali ampelopatie a partire da Glera

Popolazioni	F1 Vinaccioli	Piante
2017	5.000	3.000
2018	11.000	5.000
2019	2750	1.750
2020	15.500	10.000

↓
In due annate

Pop.	Varietà nobile	Varietà resistente	Numeri di geni di resistenza	Geni di resistenza
2012 - 2018	Glera	Kunleany, Bianca, Regent, Bronner, Solaris, Kozma 20/3, Muscaris, Souvignier gris, C50, Cabernet cantor, SK-00-1/1 e 1/2, Calardis blanc	Da 1 a 2 Rpv loci Da 0 a 1 Ren/Run loci	Rpv3, Rpv12, Rpv10, Ren3, Ren9
2019 - 2020		Floreal, 01-01-686 e 881, VC531.039, VC156.1017, VC109.033, SK-00-1/7, Glera F1s	Da 2 a 3 Rpv loci Da 1 a 2 Ren/Run	Rpv1, Rpv3, Rpv12, Rpv10, Run1, Ren1, Ren3, Ren9

2021

7500
semi

4500
piantine

2022

7500
semi

3165
piantine

SELEZIONE MOLECOLARE

Pop	Analisi molecolari	Piante selezionate
2016	1050	605
2017	2100	592
2018	4400	1800
2019	1750	1000
2020	4500+3165	2200+1500

Anno di valutazione	2020
F1 con un capo a frutto	147
F1 con grappoli e una completa valutazione fenologica	135
F1 con ridotta vigoria-produzione, mutazioni, caratteristiche negative dei grappoli (dimensione, acinellatura, etc.), e molto suscettibili alle malattie	68
F1 osservate nel corso della maturazione	12
F1 con valutazioni alla vendemmia	8

LE POTENZIALI SELEZIONI: ANALISI CHIMICA

ID code	Incrocio	Data raccolta	Brix°	Acidità titolabile g/l	pH
SR_6_5_1	GleraxBronner	03-set	21,4	4,8	3,37
SR_7_1_7	GleraxSolaris	18-set	18,5	8	3
SR_7_2_2	GleraxSolaris	10-ago	19,1	6,8	3,14
SR_7_2_6	GleraxSolaris	03-set	17,1	6,4	3,14
SR_7_3_8	GleraxSolaris	11-set	19,6	6,2	3,22
SR_7_7_8	GleraxKunleany	11-set	16,1	6,1	3,34
SR_7_8_7	GleraxKunleany	08-set	17	8,5	3,26
SR_7_8_8	GleraxKunleany	08-set	17,7	8,4	3,18
Glera		18-set	18,5	6,5	3,33
Solaris		10-ago	20,8	8,4	3,12
Bronner		03-set	19,4	7,4	3,17
Kunleany		24-ago	16,2	8,2	3,18

MOLTIPLICAZIONE DELLE SELEZIONI DEL 2020

13_06bc_038 GxBr

13_05b_006 GxSs

13_05b_001 GxSs

14_05d_012 GxSs

14_05d_023 GxSs

14_10b_086 GxKy

14_10b_111 GxKy

14_10b_112 GxKy

Materiale innestato			
VARIETÀ	FILARE	INNESTI	RESE
Glera	6_5_1	60	41
Glera	7_1_7	44	26
Glera	7_2_2	60	35
Glera	7_2_6	49	28
Glera	7_3_8	50	38
Glera	7_7_8	43	27
Glera	7_8_7	35	22
Glera	7_8_8	65	38
	TOT	406	255

Messa a dimora di almeno 25 viti per selezione,
nel 2024 LE PRIME MICROVINIFICAZIONI

Anno di valutazione	2020	2021
F1 con un capo a frutto	147	477
F1 con grappoli e una completa valutazione fenologica	135	305
F1 con ridotta vigoria-produzione, mutazioni, caratteristiche negative dei grappoli (dimensione, acinellatura, etc.), e molto suscettibili alle malattie	68	54
F1 osservate nel corso della maturazione	12	56
F1 con valutazioni alla vendemmia	8	29

Altri 5 sono stati scartati per valutazioni negative in fase di vendemmia (marciumi o peronospora)

Di cui 5 anno 2020 (3 non avevano produzione sufficiente) e 24 nuovi genotipi

GRADO BRIX ALLA VENDEMMIA

DATA DI VENDEMMIA 2021

PESO MEDIO GRAPPOLI SELEZIONI 2021

PRECURSORI AROMATICI DI DUE SELEZIONI

principali precursori di aromi in forma glicosilata

Parentale	Genotipo	Genotipo
Glera	C 7-8-8	C 7-3-8

Terpenoli

Parentale	Genotipo	Genotipo	
Glera	C 7-8-8	C 7-3-8	
somma furan linalolo ossidi	*	*	*
linalolo	*	*	**
α terpineolo	*	*	*
somma piran linalolo ossidi	**	**	*
nerolo	*	*	*
geraniolo	***	***	***
eso-2-idrossicineolo	n.d.	n.d.	n.d.
diolo I	*	*	*
<i>trans</i> -8-idrossilinalolo	**	**	**
idrossigeraniolo	***	**	***
<i>cis</i> -8-idrossilinalolo	***	***	***
acido geranico	***	**	**
7-idrossi- α -terpineolo	**	**	***

principali precursori di aromi in forma glicosilata

Parentale	Genotipo	Genotipo
Glera	C 7-8-8	C 7-3-8

Composti benzenoidi

benzaldeide	**	**	**
guaiacolo	*	**	n.d.
alcol benzilico	***	***	***
β -feniletanolo	***	***	***
eugenolo	**	**	*
vinil guaiacolo	***	***	***
trimetossifenolo	***	***	**
vanillina	**	**	*
vanillato di metile	*	**	**
alcol omovanillico	**	***	**
siringaldeide	*	**	n.d.
3-idrossibenzenemetanolo	**	**	***

Norisoprenoidi

3-idrossi- β -damascone	**	***	***
3-oxo- α -ionolo	***	***	***
3,9-diidrossimegastigma-5-ene	**	**	***
vomifoliolo	***	***	***

Composti alifatici

1-esanolo	**	**	**
<i>trans</i> -3-esen-1-olo	n.d.	*	n.d.
<i>cis</i> -3-esen-1-olo	**	*	**
2-esen-1-olo	*	*	*
esanale	**	*	*
2-esenale	**	**	**
furfurale	*	*	n.d.

Anno di valutazione	2020	2021	2022
F1 con un capo a frutto	147	477	1475
F1 con grappoli e una completa valutazione fenologica	135	305	1203
F1 con ridotta vigoria-produzione, mutazioni, caratteristiche negative dei grappoli (dimensione, acinellatura, etc.), e molto suscettibili alle malattie	68	54	1118
F1 osservate nel corso della maturazione	12	56	152
F1 con valutazioni alla vendemmia	8	21	142

IMPIANTO INCROCI

Incroci	Anno d'impianto	Selezioni di Glera	
2012-2015	2017	8	200
2016	2018	21	900
2017	2019	142	600
2018	2020		1800
2019	2021		1000
2020	2022		2200
2020/21	2023		1500

400/500 piante moltiplicate per la microvinificazione entro il 2030

2020/23 – Nuovo campo di selezione

8.200 piante oggi disponibili per la selezione

Valutazioni 2022 in corso....

Biotechnologie “antiche” e “moderne” Quali prospettive?

Dal miglioramento genetico all'avvento delle biotecnologie vegetali

1950: le leggi di Mendel e la rivoluzione verde

1977: Some DNA from the Ti plasmid is transferred into the plant cells (1977)

1982: le prime piante OGM

The development of *Agrobacterium* as a vector for plant transformation

- Modifications to the Ti plasmid
- Regeneration of transgenic plants from transformed cells

Stralci della 18/2001

Riguardo agli organismi geneticamente modificati la Direttiva 2001/18/EC recita all'articolo 2:

«organismo geneticamente modificato (OGM)», un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale. Ai fini della presente definizione:

a) una modificazione genetica è ottenuta almeno mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;

...

Il successivo Articolo 3 specifica delle deroghe:

Deroghe

1. La presente direttiva **non si applica** agli organismi ottenuti con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I B.

...

Segue...

Allegato 1A

TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2

PARTE 1

Le tecniche di modificazione genetica di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), comprendono tra l'altro:

- 1) **tecniche di ricombinazione** dell'acido nucleico che comportano la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante inserimento in un virus, un plasmide batterico o qualsiasi altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma nel quale possono replicarsi in maniera continua;
- 2) **tecniche che comportano l'introduzione diretta** in un organismo di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;
- 3) **fusione cellulare** (inclusa la fusione di protoplasti) o tecniche di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante la fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali (**non-sessualmente compatibili**).

Sono OGM

.....

Allegato I B

TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

Le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione della presente direttiva, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinante o di organismi geneticamente modificati diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno o più metodi elencati qui di seguito sono:

1. **la mutagenesi;**
2. **la fusione cellulare** (inclusa la fusione di protoplasti) di cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali (**sessualmente compatibili**).

NON-Sono OGM

Radiation mutagenesis: plant CP B144

Experimental field ENEA ('50-'60)

The grain CRESO

Varietà mutate ottenute in numerose specie di uso agricolo:
2500 varietà coltivate di cereali, industriali e ornamentali

Here to Stay

More than 2,500 mutant crop varieties have been officially registered with the United Nations and the International Atomic Energy Agency. About three-quarters of the varieties were directly induced by gamma radiation.

Il pompelmo rosa
È un agrume ottenuto per mutagenesi

**Largamente utilizzate in tutto il mondo
inclusa la coltivazione biologica**

LOCI principali disponibili
associati alla resistenza a
Erysiphe necator

Run 1, 2.1 e 2.2: *M. rotundifolia*

Ren 1: *V. vinifera*!

Ren 2: *V. cinerea*

Ren 3: *V. rupestris*? (in Regent)

Ren 4 e 5: *V. romanetii*

Ren 6 e 7: *V. piasezkii*

Ren 9: *V. rupestris*? (in Regent)

LOCI principali disponibili
associati alla resistenza a
Plasmopara viticola

Rpv 1 e 2: *M. rotundifolia*

Rpv 3: *V. rupestris*, *V. lincecumii*

Rpv 5 e 9: *V. riparia*

Rpv 8, 10 e 12: *V. amurensis*

Rpv 14: *V. cinerea*

Anni '90: i primi geni di vite associati a resistenze genetiche vengono isolati nelle viti americane

Modifica Genetica

Incrocio Convenzionale

15-25 anni

Trangenesi

3 anni

Cisgenesi

3 anni

Cisgenesi

Specie affini

1. Materiale genetico trasferibile sessualmente
2. Gene trasferito nella forma "nativa"
3. Nessuna traccia di DNA esogeno rimannente dopo il trasferimento

CRISPR/Cas9 una proteina capace di indurre mutagenesi tramite taglio dello «specifico» sito del DNA seguito da riparazione dello stesso DNA da parte della cellula

CRISPR/Cas9: biotechnology revolution (genome editing = mutagenesi biologica?)

Premi Nobel per la chimica 2020
J. Doudna e M. Charpentier

Sono da considerarsi OGM o no?

DNA danneggiato viene riparato nella cellula

Applicazione delle nuove biotecnologie alla vite:

Colli di bottiglia e soluzioni

UNIVERSITÀ
di **VERONA**

FONDAZIONE
EDMUND
MACH

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

1° difficoltà: genotipi recalcitranti

Callo embriogenico e rigenerazione di una
pianta identica alla madre

Miglioriamo anno dopo anno tuttavia molte varietà non sono ancora gestibili

anno 2021

anno 2022

use	Variety	embryogenic callus (%)
W	Aglianico	2,1
T	Autumn Royal	2,4
W	Chardonnay	16,9
T	Crimson	6,2
W	Glera	0,7
T	Italia	0,4
W	Negromaro	0,5
T	Palieri	0,5
W	Primitivo	0
T	Red Globe	2,1
T	Sultanina	10,5
T	Summer Royal	3,8
T	Victoria	2,1

use	Variety	embryogenic callus (%)
W	Chardonnay	28,8
T	Italia	0,9
W	Nero di Troia	0,2
W	Primitivo	0,4
T	Red Globe	3,1
T	Sultanina	38,2
T	Victoria	2,9

% respect to the cultured anthers

W varietà da vino
T varietà da tavola

La vite è altamente eterozigote e le varietà devono:

1. Essere trasformate ed il CRISPR/Cas eliminato (**CIS-GENESI e GENOMA EDITING**)
2. Rigenerate senza essere passate per una fase di trasformazione (**GENOMA EDITING**)

Due vie possibili:

calli embriogenici (cisgenesi+genoma editing) o
protoplasti (genoma editing puro)

Trasformazioni effettuate: *mlo* (oidio), *GST*, *NPR3* (stress)

Co-coltura 72h
Rigenerazione...

Genotipo	Costrutto	Trasformazione
Chardonnay	pDIRECT_22c_EXIT_MLO6+7	GT-1 10/2020
Microvine	pDIRECT_22c_EXIT_MLO6+7	GT-1 10/2020
110 Richter	pDIRECT_22c_EXIT_GST30+40	GT-2 11/2020
Microvine	pDIRECT_22c_EXIT_GST30+40	GT-2 11/2020
Chardonnay	pDIRECT_22c_EXIT_MLO6+7	GT-3 12/2020
Microvine	pDIRECT_22c_EXIT_MLO6+7	GT-3 12/2020
110 Richter	pDIRECT_22c_EXIT_PME3+1	GT-4 01/2021
Microvine	pDIRECT_22c_EXIT_PME3+1	GT-4 01/2021
110 Richter	pDIRECT_22c_EXIT_NPR3	GT-5 07/2021
SO4	pDIRECT_22c_EXIT_NPR3	GT-5 07/2021
Chardonnay	pDIRECT_22c_EXIT_NPR3	GT-5 07/2021
Chardonnay	pDIRECT_22c_EXIT_GST30+40	GT-5 07/2021
SO4	pDIRECT_22c_EXIT_GST30+40	GT-5 07/2021
Glera	pDIRECT_22c_EXIT_MLO6+7	GT-8 12/2021
Chardonnay	pDIRECT_22c_EXIT_MLO6+7	GT-8 12/2021
110 Richter	pDIRECT_22c_EXIT_GST30+40	GT-8 12/2021

Loredana Moffa

Linee positive sono state testate per l'eliminazione del DNA estraneo con successo

42°
C

33 eventi indipendenti hanno prodotto 33 individui in Corso di analisi

42° C induzione della eliminazione del DNA esterno

Loredana Moffa

Embryos	Transformations
4	GT-1
29	GT-3

Verified editing by sequencing amplicons

Line 29.1

Line	guide	INDELS
Plant 29.1	g25	Ins di 1 A
Plant 30.1	g25	Del 9 bp
Plant 29.1	g13	Ins G
Plant 30.1	g13	Ins di 1 G

Line 30.1

Protoplasti + sgRNA + Cas9 = no OGM

Cell wall digestion

Plant cell

Protoplast

Cpf1-crRNA (RNP) complex

PEG-mediated RNP delivery

Target genome editing

Purificazione di dCAS9-VP64, CAS9 and CAS12RR

170 kDa

98 kDa

Proteina	kDa	Concentrazione (mg/ml)
dCAS9-VP64	167	0,37
CAS9	158	2,28
CAS12 RR	130	2,39

Selected target for dCAS9-VP64
SERK1 (somatic embryogenesis receptor kinase)
BBM (ap2 domain-containing transcription factor)
LEC1 (leafy cotyledon)

Kindly provided by Carlo Bergamini

Protoplasts of Italia transfected with CAS12 RR + sgRNA AGL11_7c + PEG

Vitalità dei protoplasti e
conta

Floating

Digestione e purificazione

Callo embriogenico di uva
Italia

3×10^4
protoplasti/ml

Trasfezione

Inclusione

Gocce di Gellan gum

Microcallus di Italia

Carlo Bergamini

Saranno editati? (AGL11 gene per l'assenza di semi)

Conta dei protoplasti (Chardonnay) Fase globulare (Chardonnay)

Victoria fase a cuore

Chardonnay fase torpedo

Victoria embrioni vitali

Victoria embrioni in sviluppo

Caratteri su cui stiamo lavorando nel Progetto Biotech-Vitech

Büschges, R. et al., (1997)
The barley *Mlo* gene: a novel control element of plant pathogen resistance. *Cell* 88: 695-705

Pessina, S. et al., (2016)
Knock out of *Mlo* genes reduce susceptibility to powdery mildew in grapevine. *Hort Research* 3: 16016

Orzo *Mlo* vs. *mlo*

Mlo gene family in grapevine – distribution along the 19 chromosomes

Brachetto vite suscettibile

Brachetto-*mlo7* mutata

Geni *mlo*-like in vite come in orzo?

Il primo esempio di viti cisgeniche

Genotipo	TNL2a + TNL2b	TNL2a	TNL2b	Elementi del T-DNA
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	V	Sì	Sì	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	V	Sì	Sì	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	V	Sì	Sì	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno
Chardonnay	V	Sì	Sì	Nessuno
Chardonnay	X	Sì	No	Nessuno

Totale piante rigenerate: **22**

Totale piante cisgeniche: **18**

Totale piante cisgeniche
Tnl2a+Tnl2b:4

4 piante cisgeniche

Resoconto trasformazioni

Geni Target: MLO6+7 (susceptibilità oidio)

Genotipo	Trasformate	% editing	Tipo mutazioni	
			MLO7	MLO6
Chardonnay	Si	95%	+1 bp omozigosi	-2 bp omozigosi
Chardonnay	Si	96%	+1 bp omozigosi	-2 bp omozigosi
Chardonnay	Si	95%	-1 bp omozigosi	-1 bp omozigosi
Chardonnay	Si	-	Nessuno	
Chardonnay	Si	96%	-2 bp omozigosi	-4 bp omozigosi
Chardonnay	Si	-	Nessuno	
Chardonnay	Si	92%	+1 bp eterozigosi	
Chardonnay	Si	93%	+1 bp eterozigosi	-2 bp omozigosi
Chardonnay	Si	97%	+1 bp eterozigosi	
Chardonnay	Si	91%	+1 bp omozigosi	
Chardonnay	Si	89%	+1 bp omozigosi	
Chardonnay	Si	74%	+1 bp omozigosi	

Totale piante rigenerate: **18**

Totale piante Cas+: **15**

Totale piante editate: **12**

5 piante con efficienza $\geq 95\%$

Resoconto trasformazioni

Gene Target: NPR3 (repressore di NPR1)

Genotipo	Trasformate	% editing	Tipo mutazioni
Chardonnay	Si	95%	+1 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	69%	-3 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	97%	-2 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	96%	-2 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	96%	-11 bp omozigosi
Chardonnay	Si	94%	-4bp omozigosi
Chardonnay	Si	93%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	79%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	96%	-3 bp omozigosi
Chardonnay	Si	79%	-37bp omozigosi
Chardonnay	Si	-	Nessuno
Chardonnay	Si	42%	-37 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	94%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	50%	-4 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	48%	-2 bp omozigosi
Chardonnay	Si	96%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	91%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	94%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	96%	-37 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	94%	-37 bp omozigosi
Chardonnay	Si	-	Nessuno
Chardonnay	Si	36%	-37 bp eterozigosi
Chardonnay	Si	95%	+1 bp omozigosi

Totale piante rigenerate: **42**

Totale piante Cas+: **32**

Totale piante editate: **26**

14 piante con efficienza $\geq 90\%$

I risultati di editing su GST30/GST40

Genotipo	Trasformate	% editing	Tipo mutazioni	
			GST30	GST40
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	93%	-2 bp omozigosi	-2 bp omozigosi
Chardonnay	Sì	95%		+1 bp omozigosi
Chardonnay	Sì	91%	-1 bp omozigosi	
Chardonnay	Sì	-	Nessuno	
Chardonnay	Sì	97%	-2 bp omozigosi	

Totale piante rigenerate: **22**

Totale piante Cas+: **16**

Totale piante editate: **4**

4 piante con efficienza $\geq 91\%$

I risultati di editing su PME1/PME3

Genotipo	Trasformate	% editing	Tipo mutazioni	
			PME1	PME3
110 Richter	Sì	-	Nessuno	
110 Richter	Sì	-	Nessuno	
110 Richter	Sì	87%	-3 bp	Nessuno
110 Richter	Sì	-	Nessuno	
110 Richter	Sì	-	Nessuno	
110 Richter	Sì	-	Nessuno	

Totale piante rigenerate: **8**

Totale piante Cas+: **6**

Totale piante editate:
1

1 pianta con
efficienza $\geq 85\%$

Altri eventi di editing in rigenerazione...

Genotipo	Trasformazione	Embrioni in rigenerazione
Glera	MLO	79
Chardonnay	MLO	47
Chardonnay	GST	34
110 Richter	GST	17
Chardonnay	FER	8
110 Richter	PME	4
Chardonnay	DOF4	7

Pinot noir
Sangiovese

...

Il vuoto legislativo

NON ricadono nella definizione vigente di OGM:

- Piante dove è stato eliminato il DNA transgenico (ma rimane solo il DNA cis-genico)
- Piante dove è stato eliminato il transgene per realizzare il genome editing (ma resta il DNA editato)
- Piante ottenute tramite azione della proteina mutagenica e rigenerate post-mutagenesi

In attesa del Parlamento Europeo....

**Grazie
dell'attenzione**